

Forcipes verschiedener Arten von Clytrinen-Gattungen.

Von

J. W e i s e.

(Hierzu Taf. II, Fig. 14—35.)

Die Zeichnungen auf Taf. II geben ein vergrößertes Bild des Penis bei der Seitenansicht und bei der Betrachtung schräg von vorn und oben; in 9 Fällen ist auch die Klappe dargestellt, welche die Oeffnung in der Ruhe schließt.

- | | |
|--|---|
| Fig. 14. <i>Labidostomis taxicornis.</i> | Fig. 25. <i>Lachnaea sexpunctata.</i> |
| - 15. - <i>lusitanica.</i> | - 26. - <i>italica.</i> |
| - 16. - <i>tridentata.</i> | - 27. <i>Clytra 9-punctata</i> Ol. |
| - 17. - <i>humeralis.</i> | - 28. - <i>4-punctata.</i> |
| - 18. - <i>longimana.</i> | - 29. - <i>appendicina.</i> |
| - 19. - <i>pilicollis.</i> | - 30. - <i>laeviuscula.</i> |
| - 20. - <i>cyanicornis.</i> | - 31. <i>Gynandrophth. flavicollis.</i> |
| - 21. - <i>rufa.</i> | - 32. - <i>diversipes.</i> |
| - 22. <i>Lachnaea hirta.</i> | - 33. <i>Coptocephala unifasciata.</i> |
| - 23. - <i>pubescens.</i> | - 34. - <i>floralis.</i> |
| - 24. - <i>orientalis.</i> | - 35. - <i>rubicunda.</i> |

Forcipes verschiedener Arten von Donaciinen etc.

Von

J. W e i s e.

(Hierzu Taf. III, Fig. 1—34.)

Der Penis der Donaciinen zeichnet sich durch ein langes, festes Plättchen aus, das, im Zustande der Ruhe, in einer Rinne auf der Oberseite liegt und mit der büschelförmig behaarten Spitze die kleine Oeffnung für den *ductus* bedeckt. Dieses Plättchen, welches ich die Stütze, *fulcrum*, nenne, ist bei der Seitenansicht des Penis (2 Fälle ausgenommen) mitgezeichnet, sodann für sich allein in der Vorderansicht dargestellt, bei der Vorderansicht des Penis jedoch fortgelassen.